

NY Center For  
Ear, Nose Throat, Sinus & Allergy, LLP

KANHAIYALAL KANTU, M.D., F.A.C.S.  
SANJAY KANTU, M.D.  
MANOJ KANTU, M.D.  
DIPLOMATES AMERICAN BOARD  
OF OTOLARYNGOLOGY

SINUS & ALLERGY  
FACIAL PLASTIC SURGERY  
HEARING & BALANCE DISORDERS  
SNORING & SLEEP APNEA  
HEAD & NECK SURGERY

## INSTRUCCIONES PARA PRUBA DE ALERGIA

Por favor, siga estas instrucciones antes de la prueba de alergia.

1. **Antihistamínico Todos los medicamentos debe ser dejado de 7 días antes de la prueba de alergia.** Estos incluyen allegra, beadryl, Claratin, Zyrtec, Tylenol fría y los senos, clortimeton, la mayoría over-the-counter resfriado, astelin aerosol nasal, patanase, etc.
2. **Si usted tiene un resfriado, fiebre, gripe del tipo de síntomas, exacerbación de asma, o fiebre del heno importantes síntomas, prueba de alergia debe ser reprogramado.**
3. No hay cambios en su dieta son necesarios antes de la prueba.
4. **Asegúrese de usar una manga corta o camiseta sin mangas para la prueba. Lleve algo para leer desde tiempos de reacción puede variar.** Pruebas podrá tomar hasta 40 minutos.

Nuestro departamento de alergia está abierto todos los días para su conveniencia.

Gracias!!!

NY Center for Ear, Nose, Throat, Sinus & Allergy